

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscopy)

การตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อยาวโค้งงอได้ ส่องกล้องตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้นและสามารถตัด ชิ้นเนื้อที่มีความผิดปกติส่งตรวจหรือทำหัตถการ อื่นๆ เช่น รััดเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร โดยไม่ต้องผ่าตัด

► เตรียมตัวก่อนผ่าตัดอย่างไรให้พร้อม

1. เห็นศัลยแพทย์หรือพยาบาลในแบบฟอร์มโรงพยาบาล
2. งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์
3. เก็บเครื่องประดับ ของมีค่า ฟันปลอม ควรถอดเก็บไว้
4. กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือแพ้ยา ให้แจ้งพยาบาลห้องผ่าตัดรับทราบข้อมูลด้วย หากรับประทานยาประจำตัวให้นำติดตัวมาด้วย
5. ก่อนวันผ่าตัดถ้าเป็นหวัด มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ แจ้งที่แผนกนัดผ่าตัด
6. ต้องทำความสะอาดร่างกายทั่วไป เช่น อาบน้ำ สระผม ตัดเล็บมือ-เท้าให้สั้น

7. งดน้ำงดอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืน 8 ชั่วโมง ก่อนการผ่าตัด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
8. นำใบนัดมายื่นที่...ห้องผ่าตัด
9. นำญาติที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้มาในวันที่เข้ารับการผ่าตัด อย่างน้อย 1 คน
10. เข้าวันผ่าตัด จะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ

► การปฏิบัติตัวขณะส่องกล้อง

- ให้ผู้ป่วยอมและกลืนยาชา 2% xylocain viscus จำนวน 5 cc 1 ครั้ง และพ่นยาชาในลำคอด้วย 10 % xylocain Spray 3 ครั้ง ซึ่งอาจจะมึนงง
- ให้อาหารว่าง/ยาแก้ปวดในบางราย
- ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้าย แพทย์จะสอดกล้องผ่านทางปาก ขณะที่กล้องผ่านลำคอจะให้ผู้ป่วยช่วยกลืน
- เมื่อกำลังส่องผ่านบริเวณคอดังในหลอดอาหารแล้วให้ผู้ป่วยหายใจเข้า-ออกลึก ๆ ซ้ำ ๆ ปล่อยตัวตามสบาย ไม่เกร็ง หากมีน้ำลายในปากไหลออกมาจำนวนมาก พยาบาลจะทำการดูดน้ำลายให้เป็นระยะ ๆ

► การปฏิบัติตัวภายหลังการส่องกล้องตรวจ

- นอนพัก เพื่อสังเกตอาการผิดปกติประมาณ 1-2 ชั่วโมง
- ห้ามดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารจนกว่าจะหายชา เมื่อคอบหายชาแล้ว ให้ทดลอง จิบน้ำ ถ้าไม่สำลักจึงดื่มได้
- ให้สังเกตน้ำลายที่บ้วนออกมา อาจมี เลือดปนบ้างเล็กน้อย แต่ถ้ามีเลือดออกมากผิดปกติ ให้รายงานแพทย์
- ภายหลังการตรวจอาจมีอาการเจ็บคอ
- ควรรับประทานอาหารเหลวหรืออาหารอ่อนรสไม่จัด 2-3 วัน
- ควรหลีกเลี่ยงอาหารร้อนจัดหรือเย็นจัด
- ออกกำลังกายหรือทำงานได้ตามปกติ
- ในรายที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ (ไม่รู้สึกรู้สึกระหว่างตรวจ) ห้ามขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจ อย่างน้อย 24 ชม. หลังการตรวจ
- ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการปวดมาก บริเวณลำคอ หน้าอก ท้อง หายใจลำบาก มีไข้สูง ควรรีบมาพบแพทย์
- มาพบแพทย์ตามวันและเวลาดนัด

▶ อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์

1. มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจหอบ
2. มีอาการเจ็บหน้าอก ขณะกลืนอาหาร
3. มีอาการปวดท้องมาก
4. มีอาเจียนเป็นเลือด
5. มีไข้สูง 38 องศา หลังส่องกล้อง



การเตรียมความพร้อม

สำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ
การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน
(Esophagogastroduodenoscopy)

หมายเหตุ...

วันรุ่งขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
โทรศัพท์ไปสอบถามอาการของท่าน
กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ง่าย
แก่ทางโรงพยาบาลด้วยค่ะ

ข้อมูลการรักษา

โรงพยาบาลมหाराชนครศรีธรรมราช

หน่วยส่องกล้อง

075-340250 ต่อ 8612

ศูนย์บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

075-340250 ต่อ 8710

ห้องฉุกเฉิน

075-340250 ต่อ 4130,4119

โทรสายด่วน 1669

หน่วยบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.30 น.



ด้วยความปรารถนาดี...

รพ.มหाराชนครศรีธรรมราช

ศูนย์บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

โทร. 075 - 340250 ต่อ 8710

มือถือ 095-2738915

โทรสาร 075 - 343066



SCAN ME